

PROCESSO 001/2018 **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

DATA ____/____/____.

Telefone: (____) _____
(____) _____

NOME COMPLETO: _____

GABARITO

PROCESSO 001-2018

Instruções de preenchimento do gabarito

- Você recebeu um cartão de resposta, contendo 20 questões objetivas.
- Leia atentamente as questões e escolha a resposta que você considerar correta.
- Procure responder a todas as questões.
- Marque apenas uma alternativa para cada questão. Caso o candidato marque mais de uma alternativa, será automaticamente anulada a questão, mesmo que uma das alternativas esteja correta.
- Assinale no cartão de resposta, com caneta de tinta preta ou azul, não sendo ACEITO o preenchimento feito à LAPIS.
- Não é permitido nenhum tipo de instrumento eletrônico como aparelho celular, calculadoras, relógio ou qualquer outra fonte de consulta.
- Ao terminar a prova, você entregará ao fiscal o caderno de prova, a folha de resposta.
- Será autorizado levar apenas a folha de resposta do CANDIDATO.
- Cada candidato terá direito apenas um gabarito, não será concedido outro em caso de erro de preenchimento.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C | D | E | F | 6 | A | B | C | D | E | F | 11 | A | B | C | D | E | F | 16 | A | B | C | D | E | F |
| 2 | A | B | C | D | E | F | 7 | A | B | C | D | E | F | 12 | A | B | C | D | E | F | 17 | A | B | C | D | E | F |
| 3 | A | B | C | D | E | F | 8 | A | B | C | D | E | F | 13 | A | B | C | D | E | F | 18 | A | B | C | D | E | F |
| 4 | A | B | C | D | E | F | 9 | A | B | C | D | E | F | 14 | A | B | C | D | E | F | 19 | A | B | C | D | E | F |
| 5 | A | B | C | D | E | F | 10 | A | B | C | D | E | F | 15 | A | B | C | D | E | F | 20 | A | B | C | D | E | F |

PROCESSO 001/2018 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1 - Paciente em uso de droga digitálica. Qual o principal cuidado de enfermagem que devemos ter?

- (A) Verificação da temperatura.
- (B) Monitorização do nível de consciência.
- (C) verificação da perfusão periférica.
- (D) Verificação do pulso.

2 - Para administrar 1.500ml de soro, em 24 horas, é necessário que o número de gotas por minuto seja de:

- (A) 7 gotas
- (B) 14 gotas
- (C) 21 gotas
- (D) 28 gotas
- (E) 35 gotas

3 - Um frasco de 5ml de heparina contém 25.000 unidades. Para cumprir uma prescrição de 5.000U, o profissional de enfermagem deverá aspirar a quantidade equivalente, em ml, a:

- (A) 5,0ml
- (B) 4,0ml
- (C) 3,5ml
- (D) 2,0ml
- (E) 1,0ml

4 - Antibiótico de largo espectro largamente utilizado em unidades hospitalares tem frasco ampola em apresentações mais comuns com 5.000.000 UI e 10.000.000 UI. Diferente da maioria das medicações, no solvente da penicilina cristalina, deve-se considerar o volume do soluto. Assinale a alternativa correta:

- (A) se 5.000.000 UI estão para 8 ml AD + 2 ml de cristais, logo 5000.000 UI estão para 12 ml.
- (B) se 8.000.000 UI estão para 6 ml AD + 4 ml de cristais, logo 8.000.000 UI estão para 8 ml.
- (C) se 10.000.000 UI estão para 16 ml AD + 4 ml de cristais, logo 10.000.000 UI estão para 20 ml.
- (D) se 10.000.000 UI estão para 5 ml AD + 4 ml de cristais, logo 10.000.000 UI estão para 5 ml.

5. Dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus, que ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais do mundo, inclusive no Brasil. As epidemias geralmente ocorrem no verão, durante ou imediatamente após períodos chuvosos. Sobre o tratamento da dengue, assinale a alternativa correta:

- (A) Deve-se evitar ingerir muito líquido como água, sucos, chás, soros caseiros, etc
- (B) Os sintomas não podem ser tratados com dipirona ou paracetamol.
- (C) Não existe tratamento específico para dengue, apenas tratamentos que aliviam os sintomas.
- (D) Devem ser usados medicamentos à base de ácido acetilsalicílico e antiinflamatórios, como aspirina e AAS.

PROCESSO 001/2018 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

6- A via de absorção mais indicada para a administração de substâncias oleosas é a:

- (A) Sublingual
- (B) Intramuscular
- (C) Intradérmica
- (D) Oral
- (E) Endovenosa

7- O rodízio sistemático dos locais de aplicação de injeções de insulina evita:

- (A) Potencialização do medicamento pela diminuição da resistência tecidual
- (B) Diminuição do tônus muscular na área de aplicação
- (C) Alteração localizada do tecido adiposo, que impedirá a absorção do medicamento.
- (D) Aumento da percepção sensorial dolorosa, no ato de aplicação.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores

8- Qual a função do Windows explore?

- (A) Exibir arquivos e pastas do computador.
- (B) Navegar na Internet.
- (C) Criar e armazenar notas.
- (D) Criar e Editar desenhos.

9- A maneira pela qual o técnico de enfermagem pode evitar a disseminação de uma infecção é:

- (A) Utilizando técnica asséptica para todas as ações
- (B) Carregando roupas de cama junto ao corpo
- (C) Jogar no chão as roupas de cama que o paciente já utilizou
- (D) Trazer o ramper para dentro do quarto enquanto faz a troca de fraldas, e ou troca de roupa de cama do paciente.
- (E) Deixar oclusores com agulhas na mesa de refeições do paciente.

10- Prescritos 1000 ml de SF 0,9% 16 gotas/min. Quantos ML serão administrados por hora?

- (A) 48 ml/hora
- (B) 49 ml/hora
- (C) 47 ml/hora
- (D) 50 ml/hora

11- A atitude adequada diante de um paciente que lhe confia que irá se suicidar é:

- (A) Não dar atenção, pois quem avisa não se mata
- (B) Administrar medicamentos sedativos potentes para acalmá-lo
- (C) Dizer que a vida é bela e que se suicidar é pecado
- (D) Fingir que não ouviu o relato do paciente
- (E) Planejar junto à equipe um atendimento intensivo no intuito de observar este paciente constantemente e realizar abordagem tranquilizadora, conversando com o paciente a respeito de suas idéias, sem juízo de valor

PROCESSO 001/2018 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

12- A fototerapia é o método mais utilizado no tratamento convencional da icterícia neonatal. Os cuidados de enfermagem necessários para esse procedimento são:

- (A) manter recém-nascido desnudo, uso de protetor ocular, controle da radiância das lâmpadas diariamente, controle das eliminações, controle da temperatura, hidratação.
- (B) manter recém-nascido desnudo, uso de protetor ocular, controle laboratorial e troca de lâmpada a cada 2 meses.
- (C) uso de protetor ocular, troca de lâmpada a cada 4 meses, atenção às eliminações fisiológicas e manter o recém-nascido desnudo.
- (D) atenção à coloração da pele, troca de Lâmpada a cada 2 meses, controle hídrico e protetor ocular.
- (E) atenção à coloração da pele, atenção às eliminações fisiológicas e manter recém-nascido desnudo.

13- São cuidados na amostra de escarro para diagnóstico de Tuberculose, o teste TMR-TB, exceto:

- (A) utilizar frasco não estéril
- (B) coletar amostra após expectoração profunda, sem uso de máscara N95
- (C) nenhuma das alternativas
- (D) encaminhar o material para o laboratório após as 48 horas de internação

14- Cem unidades internacionais (UI) de insulina são o mesmo que:

- (A) 0,5ml
- (B) 1ml
- (C) 1,5ml
- (D) 2ml

15- A punção venosa de MMII em adulto é contra indicada devido a:

- (A) risco de Flebite.
- (B) risco de Neurite.
- (C) risco de trombose.
- (D) risco de gangrena.

16- Prescrito Benzetacil® 400.000UI. Tenho frasco de 1200.000UI e diluente de 4mL. Quanto deverá ser administrado ?

- (A) 2,0mL
- (B) 1,3mL
- (C) 1,5mL
- (D) 1,6mL

17- Na coleta de urina de 24 horas, o paciente deverá:

- (A) Desprezar o primeiro jato de urina
- (B) Anotar o primeiro jato de urina desde o primeiro dia da internação
- (C) Esvaziar a bexiga antes de iniciar o exame
- (D) Desprezar a urina da manhã, independente do início de exame
- (E) Realizar cateterismo vesical

18- Um paciente reclamou do profissional de enfermagem por este não ter colocado o biombo para promover-lhe a higiene íntima. Estava, de fato, sendo desrespeitado o:

- (A) Natural pudor
- (B) Credo religioso
- (C) Repouso matinal
- (D) Acesso à informação
- (E) Direito à assistência

19- Deixar de administrar um medicamento no horário previsto caracteriza-se como:

- (A) Dolo
- (B) Culpa
- (C) Imprudência
- (D) Negligência
- (E) Imperícia

20- Prescritos 200 mg de Keflin® EV. Apresentação Keflin® 1g e diluente de 5 ml. Quantos ML serão administrados?

- (A) 1 ml
- (B) 3 ml
- (C) 4 ml
- (D) 5 ml

GABARITO DO CANDIDATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C | D | E | F | 6 | A | B | C | D | E | F | 11 | A | B | C | D | E | F | 16 | A | B | C | D | E | F |
| 2 | A | B | C | D | E | F | 7 | A | B | C | D | E | F | 12 | A | B | C | D | E | F | 17 | A | B | C | D | E | F |
| 3 | A | B | C | D | E | F | 8 | A | B | C | D | E | F | 13 | A | B | C | D | E | F | 18 | A | B | C | D | E | F |
| 4 | A | B | C | D | E | F | 9 | A | B | C | D | E | F | 14 | A | B | C | D | E | F | 19 | A | B | C | D | E | F |
| 5 | A | B | C | D | E | F | 10 | A | B | C | D | E | F | 15 | A | B | C | D | E | F | 20 | A | B | C | D | E | F |